

# Bijwerking medicijnen onderschat'

DVHN | Gepubliceerd op 28 december 2012, 08:43



DEN HAAG - Zes van de tien ziekenhuispatiënten kampen met bijwerkingen van de medicijnen die ze toegediend krijgen. In één op de acht gevallen [wordt](#) de schade veroorzaakt door een medicatiefout.

Dat blijkt uit [onderzoek](#) onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen, waarover het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde deze week schrijft.

Van de ruim zeshonderd patiënten uit het onderzoek kreeg meer dan de helft (58 procent) problemen door het medicijngebruik. Het gaat meestal niet om ernstige bijwerkingen, maar ze kunnen de kwaliteit van leven van patiënten wel fors verslechteren. De meest voorkomende bijwerkingen veroorzaakt door vermijdbare medicatiefouten zijn verstopping, diarree, ademhalingsproblemen, afwijkende bloedwaarden, misselijkheid, duizeligheid en valproblemen.

De meeste fouten worden gemaakt bij medicijnen voor het zenuwstelsel en [middelen](#) die inwerken op bloed, beenmerg en milt. Vrouwen en patiënten met meerdere aandoeningen onder de leden hebben het meest last van bijwerkingen.

Dagblad van het noorden